

Vážená klientka,
vážení klient,

od 01.01.2016 platia nové zákonom stanovené pravidlá pre poskytovateľky a poskytovateľov sexuálnych služieb:

Interval zdravotnej prehliadky vyšetrenia bude predĺžený na šesť týždňov.

V rámci zákonom predpísanej zdravotnej prehliadky osôb, ktoré poskytujú sexuálne služby (Z.z. 198/2015; Z.z 728/1993 v platnom znení), na oslobodenie od pohlavne prenosných chorôb a HIV-infekcie sú vykonávané nasledovné vyšetrenia:

1. **Pred zahájením činnosti:**
 - krvné testy na syfilis a HIV (príp. hepatitída B),
 - ster na gonokoky (baktérie, ktoré zapríčiňujú kvapavku [Tripper] a chlamýdie (baktérie, ktoré vyvolávajú tzv. chlamýdióvu infekciu).
2. **Následne v odstupe 6 týždňov** sa opakuje vyšetrenie na výskyt gonokokovej a chlamýdiovej infekcie.
3. **V odstupe 12 týždňov** sa opakuje rozbor krvi na syfilis a HIV.

Krátke informácie k menovaným chorobám

SYFILIS (LUES) je choroba zapríčinená baktériou *Treponema pallidum*.

Syfilis je prenášaný hlavne prostredníctvom nechráneného pohlavného styku, dokonca aj cez orálny a análny sex.

Dôsledné a správne používanie prezervatívov chráni pred nakazením/infekciou.

Diagnóza syfilisu prebieha dôkazom určitých bielkovín (protilátok) v krvi (napr. TPPA-Test).

AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) je choroba, ktorá je zapríčinená **HIVírusom (HIV)**.

Infekcia s HI-Vírusom prebieha prostredníctvom nechráneného sexu a tiež výmenou ihiel pri vnútrožilovom užívaní drog.

Najúčinnejším opatrením, ochranou pred HIV je **dôsledné a správne používanie kondómov**.

HIV-infekcia je diagnostikovaná krvným testom.

HEPATITÍDA B je zápal pečene, ktorá je spôsobená vírusom hepatitídy-B (HBV).

Typické spôsoby prenosu hepatitídy B v dospelosti sú nechránené sexuálne kontakty.

Ochranu pred infekciou poskytuje **vakcína** (základná imunizácia pozostáva z troch očkovaní, preočkovania prebiehajú po kontrole na koncentráciu protilátok tvorených v krvi).

Detekcia infekcie HBV sa vykonáva pomocou krvi.

KVAPAVKA (TRIPPER) je choroba, ktorá je zapríčinená baktériami menom *Neisseriae gonorrhoeae* (gonokoky).

Kvapavka sa prenáša takmer výhradne nechráneným pohlavným stykom.

Dôsledné a správne používanie kondómov chráni pred nakazením/infekciou.

Dôkaz o infekcii u osôb bez chorobných príznakov sa vykonáva z výteru z hrdla, močovej trubice, príp. z pošvy a konečníka (takzvaný PCR-Test). Pri existencii chorobných príznakov je možná aj priama detekcia baktérií steru.

CHLAMÝDIOVÁ INFEKCIA pohlavných orgánov je zapríčinená baktériami menom *Chlamydiae trachomatis*.

Genitálna chlamýdiová infekcia sa prenáša nechráneným pohlavným stykom.

Dôsledné a správne používanie kondómov chráni pred nakazením/infekciou.

Dôkaz o chlamýdiovej infekcii genitálií sa vykonáva z výteru močovej trubice, príp. pošvy.

DÔLEŽITÉ

Pri príznakoch, ktoré poukazujú na sexuálne prenosnú infekciu, prídite okamžite na vyšetrenie, bez ohľadu na dátum poslednej kontroly a na zákonom ustanovený interval kontroly, aby sa mohla čo najskôr stanoviť diagnóza a začať požadovaná liečba.

Pravidelné vyšetrenie na oslobodenie od prenosných chorôb a HIV-infekcie nenahrádza gynekologické vyšetrenie na rakovinu krčka maternice alebo rakoviny prsníka. Odborný lekár/lekárka pre gynekológiu a pôrodnosť Vám tiež poskytne poradenstvo k téme Antikon cepcia.

Zur Verfügung gestellt vom Referat für sexuelle Gesundheit und Prostitution,
Gesundheitsdienst der Stadt Wien im Jänner 2016.